


 ANMCS unitate aflată în PROCES DE ACREDITARE ORL	PROTOCOL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT	Ediția:III Revizia:0
	PROTOCOL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AL NEOPLASMULUI LARINGIAN	Data implementării: Exemplar nr. 1

Nr. 20 din 4.02.2021




PROTOCOL: PROTOCOL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT AL NEOPLASMULUI LARINGIAN

Cod: Pr.D.T-SCMUT-ORL-01


(conform codificării de la pct. 3 din Ghid)

Echipa de elaborare a protocolului

Prof.Univ. Dr. Balica Nicolae - _____
 (Grad, nume, prenume) 


 Conf.Univ. Dr. Hegheș Alina
 farmacist primar clinician

Dr. Trusca Doina - _____
 (Grad, nume, prenume) 

Dr. Tischer Alina - _____
 (Grad, nume, prenume) 

Prezentul protocol medical a fost avizat de Consiliul medical, în cadrul ședinței din data de 4.02.2021 (P.V. nr. 2 din 4.02.2021)

1. CUPRINS

1. LISTA DE DIFUZARE	3
2. SCOP ȘI OBIECTIVE (MOTIVARE ȘI FUNDAMENTARE)	3
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ APLICABILE PROTOCOLULUI.....	3
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI.....	4
5. DESCRIEREA PROTOCOLULUI A METODELOR, A TEHNICILOR ȘI A PROCEDURILOR.....	4
6. RESURSELE UMANE ȘI MATERIALE NECESARE FIECĂREI INSTITUȚII PENTRU IMPLEMENTAREA PROTOCOLULUI, INCLUSIV COLABORĂRILE INTRAINSTITUȚIONALE ȘI INTERINSTITUȚIONALE.....	6
7. CONDIȚII DE ABATERE DE LA PROTOCOL.....	6
8. DIAGRAMA – ALGORITMUL.....	7
9. INDICATORI DE EFICIENTĂ ȘI EFICACITATE.....	8
10. ANEXE.....	9

2. LISTA DE DIFUZARE

Nr. crt.	Scopul difuzării	Microstructura/Persoana	Data difuzării	Semnătura
1.	Aplicare	ORL		
1.	Informare	S.C.M.U.T		
3.	Evidență	ORL/C.M.		

3. SCOP ȘI OBIECTIVE (MOTIVARE ȘI FUNDAMENTARE)

- Eficientizarea diagnosticului și tratamentului neoplasmului laringian în cadrul secției ORL a SCMUT;
- Creșterea calității examinării clinice și paraclinice a pacienților cu neoplasm laringian;
- Îmbunătățirea calității tratamentului pacienților cu neoplasm laringian;
- Creșterea numărului de pacienți cu neoplasm laringian care mențin funcția fonatorie și activitatea zilnică;
- Creșterea calității vieții pacienților cu neoplasm laringian.

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ APLICABILE PROTOCOLULUI

- Guidance from WHO's Department of Violence and Injury Prevention and Disability and the Curs Oto-Rino-Laringologie Stomatologie Stan Cotulbea, Colaboratorii Lito UMFT 2004
- Oto-Rhino-Laryngology Stan Cotulbea, Colaboratorii Lito UMFT, 2002;
- Elemente de semiologie și patologie în ORL, Poenaru Marioara și colab. LITO UMFT 2006 partea I și II;
- Oto-Rino-Laringologie Curs pentru studenți și medici rezidenți. Poenaru Marioara și colab. LITO UMFT 2007 Partea I și II;
- Oto-Rino-Laringologie Cotulbea S. și colab. LITO UMFT 2009;
- Elemente de semiologie și patologie ORL, Editura „Victor Babes” Timisoara, 2014, ISBN 978-606-8054-62-9;
- Curs de Oto-Rino-Laringologie Partea I și II Stan Cotulbea, Colaboratorii LITO UMFT 2004
- Actualități în Otorinolaringologie Cotulbea S. și colab. BRUMAR, 2007;
- Curs Oto-Rino-Laringologie Stomatologie Cotulbea S. și colab. LITO UMFT 2007
- Guidance from WHO's Department of Violence and Injury Prevention and Disability and the Department of Essential Health Technologies, Prevention and management of wound infection;
- Monografii internationale de specialitate;
- Ghiduri și protocoale interne și internaționale de profil;
- Site-uri medicale internet;
- Legislație în vigoare.

5. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau dacă este cazul, actul care definește termenul
5.1. DEFINIȚII:		
1	Neoplasm laringian	Tulburările de fonație (răgușeala) și tulburările respiratorii (lipsa de aer), senzația de corp străin, tusea. Ele sunt consecutive obstacolului de la nivelul laringelui, prin evoluția progresivă a procesului tumoral. Tabloul clinic este dominat de disfonie (răgușeala) cu diverse grade de intensitate, ajungând la „vocea lemnosă”. Cancerul laringian netratat, indiferent de localizare și de forma histologică (de tipul de celule din care e format), evoluează spre obstrucția completă a lumenului laringian, către extensie ganglionară, metastaze la distanță, cașexie (slăbire foarte accentuată), exitus (moarte).
1.1	Neoplasm laringian supraglotic	În localizarea supraglotică dificultatea la deglutiție (înghițire), reprezintă simptomul major. Alături de acestea apar alte simptome subiective: jena faringo-laringiană, senzație de corp străin hipofaringian (în partea inferioară a faringelui), tulburări parestezice (pacientul nu simte o parte a gâtului), dureri cu localizare otică (în ureche).
1.2	Neoplasm laringian subglotic	În cancerele cu localizare sub corzile vocale (subglotice), disfonia se instalează tardiv, manifestarea inițială fiind dispnea (dificultate în respirație), care este permanentă sau intermitentă și se agravează la eforturile fizice.
5.2. ABREVIERI:		
1	SCMUT	Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
2	ORL	Otorinolaringologie
3	CM	Comisia de Monitorizare
4	PO	Procedura operatională
5	E	Elaborare
6	V	Verificare
7	A	Aprobare
8	Ap	Aplicare
9	Ah	Arhivare
10	Av	Avizare

6. DESCRIEREA PROTOCOLULUI A METODELOR, A TEHNICILOR ȘI A PROCEDURILOR

Stabilirea diagnosticului clinic:

Anamneza evidențiază modalitatea de debut a suferinței, localizarea, ritmul și iradierea durerii.

- Tabloul clinic este dominat de disfonie (răgușeala) cu diverse grade de intensitate, ajungând la „vocea lemnosă”. În cancerele cu localizare sub corzile vocale (subglotice), disfonia se instalează tardiv, manifestarea inițială fiind dispnea (dificultate în respirație), care este permanentă sau intermitentă și se agravează la eforturile fizice. În localizarea supraglotică dificultatea la deglutiție (înghitire), reprezentă simptomul major. Alături de acestea apar alte simptome subjective: jena faringo-laringiană, senzație de corp străin hipofaringian (în partea inferioară a faringelui), tulburări parestezice (pacientul nu simte o parte a gâtului), dureri cu localizare otică (în ureche).
- Investigațiile paraclinice inclusiv criteriile de stabilire a ierarhizării investigațiilor necesare/imediate dacă pacientul nu are investigații în ultimele 3 luni (biochimie, coagulometrie, HLG, VSH, CRP, Glicemie, ALAT, ASAT, Uree, Creatinină, Acid Uric); radiografie de torace; consult cardiologic; examenul histopatologic.
- Diagnostic pozitiv: examen histopatologic;
- Complicații:

Hemoragia

- Precoce: primele 24 de ore (cele mai frecvente)
- Tardiva: între a 5-a, a 8-a zi (datorită nerespectării regimului alimentar)

Infecția: Rar: abces laterofaringian etc.

Diverse: fistula faringocutanată;

Altele: fonatorii, nervoase, distrofice.

- Tratamentul: se face în funcție de mărimea tumorii, de gradul de extindere, de vârstă și dorința bolnavului, prezența altor boli.

Când tumorile canceroase sunt de dimensiuni mici și permit în continuare mișcarea corzilor vocale chirurgul poate extirpa tumoră, iar pacientul se va putea alimenta, respira normal ca înainte și va continua să vorbească, puțin mai răgușit.

Se efectuează traheotomie când tumoră are dimensiuni mari și produce obstrucția căilor aeriene superioare, iar dacă tumoră a determinat dificultăți în alimentația orală (atât pentru solide, cât și pentru lichide) se impune montarea unei sonde nazo-gastrice.

Când coarda vocală nu se mai poate mișca chirurgul orl-ist este obligat să îndepărteze tot laringele. Din păcate, majoritatea cazurilor de cancer laringian ajung într-o fază avansată și în consecință singura operație posibilă din punct de vedere oncologic este operația de laringectomie totală, care presupune îndepărțarea totală a laringelui și sutura traheei la piele ceea ce înseamnă pierderea totală a funcției fonatorii a laringelui, cu respirație definitivă pe canulă. Funcția fonatorie poate fi parțial compensată și recuperată prin școlarizarea bolnavului, prin cursuri de erigofonie (bolnavul este educat să îngheță aer și să-l expulzeze sacadat controlat, producând o voce inteligibilă).

- Evolutie, monitorizare: După circa 14 zile de la operație, bolnavul fără laringe se va putea alimenta, dar va respira prin canula traheală. În lipsa laringelui, el nu poate vorbi, dar o serie de exerciții îl pot învăța să vorbească din stomac, precum ventrilocii, educându-și eliminarea aerului din stomac. Există și aparatul (laringofon) care produce o voce metalică, de robot, precum și proteze implantabile intraoperator. Cancerul de laringe dă metastaze și se împrăștie mai ales în ganglionii din vecinatate.
- Dispensarizarea ORL: Urmărirea post-terapeutică are ca și scop depistarea eventualelor recidive locale, apariția metastazelor. Controlul post-terapeutic cuprinde: examen clinic general, examen local ORL, radiografia pulmonară, investigații de laborator. Consult ORL peste 4 săptămâni (lunar în primul an post-operator, la 3 luni în anul II post-operator, semestrial în anul III, apoi anual în anul IV și V postoperator).

- Recomandări de monitorizarea după externare:

○ **Vocea se pierde.** Dupa realizarea laringectomiei, vocea se pierde. Dar acest lucru nu inseamna ca nu veti mai putea vorbi. Puteti inca sa formati consoane si vocale chiar si fara voce, iar ascultatorul poate chiar sa va citeasca pe buze. O alta cale de a comunica este posibila cu ajutorul stiloului si a hartiei. A iti pierde vocea poate sa fie o experienta traumatizanta atat pentru dvs cat si pentru familia dvs. Vocea face parte din personalitatea dvs, ea va permite sa va exprimati gandurile si sentimentele si sa formati legaturi cu alti oameni. Totusi , aveti mari sanse sa vorbiti iarasi.

○ **Problemele respiratorii sunt obisnuite** Pierderea vocii nu este singura consecinta a unei laringectomii. Tot procesul de respiratie va fi realizat prin traheostoma si aerul nu va mai trece prin nas si/sau prin calea superioara respiratorie. Nasul si calea superioara respiratorie au mai multe functii importante: 1. Este un schimbator eficace al caldurii si al umezelii, incalzind aerul pana la 36°C (97°F) si umezindu-l pana la 98% cand trece in plamani. 2. Filtreaza impuritatile din aer 3. Este responsabil cu simtul miroslui si ajuta in sensatia de gust 4. Distanta dintre nas si plamani ne produce rezistenta la respirat fiind foarte importanta pentru cantitatea maxima de aer. Dupa operatie, respiratia dvs va deveni artificiala si aerul pe care il veti inhala va fi uscat, rece si nefiltrat ceea ce va face ca sistemul dvs respirator sa fie extrem de sensibil la mediu. Veti putea observa o crestere a tusei si a productiei de sputa precum si o scadere a enegiei.

○ **Miroslul si gustul** Dupa o laringectomie totala, simtul miroslui si al gustului se va diminua. Acest lucru se intampla pentru ca mucoasa nasului un organ numit epiteliu olfactiv si aerul nu vor mai trece prin aceasta zona. Epiteliul olfactiv este in mare parte raspunzator pentru detectarea miroslui, dar el mai joaca un rol important in identificarea gustului (gustul este afectat de mirosl). Exista mai multe cai pentru a invata sa va recapatati gustul si miroslul. Recuperarea acestor functii ar trebui sa fie o parte importanta din reabilitarea dvs de vreme ce fara mirosl nu puteti sa detectati semnale periculoase precum gazul sau fumul.

7. RESURSELE UMANE SI MATERIALE NECESARE FIECĂREI INSTITUȚII PENTRU IMPLEMENTAREA PROTOCOLULUI, INCLUSIV COLABORĂRILE INTRAINSTITUȚIONALE ȘI INTERINSTITUȚIONALE

- Resurse umane, competențe necesare: medic primar/specialist, medic rezident, asistent medical;
- Resurse materiale, echipamente medicale: acces la laborator analize, laborator imagistică, baza de tratament complex chirurgical si oncologic (radioterapeutic/chimioterapie).


8. CONDIȚII DE ABATERE DE LA PROTOCOL

- Reglementări juridice¹
- Nivel de competență, grade academice universitare
- Eventuale studii clinice (derulate în spital, aprobatate de către Comisiile de Etică), care permit abaterea de la protocol. Responsabilitate legală: În caz de necesitate, clinicienii vor apela la judecata clinică, cunoștiințele și experiența pe care le au pentru a decide abaterea de la protocolul dezvoltat.
- Abaterile de la prevederile protocolului dezvoltat se vor documenta și se vor argumenta, ținând cont de circumstanțele individuale ale fiecărui bolnav, de opțiunile exprimate de către pacient și de experiența clinică a practicianului. Abaterile justificate medical prin particularitățile cazului pot fi legate de:
 - Vârste extreme;
 - Sex;

¹Exemplu: art. 14 din OMS 1410/2016 prevede: "Art. 14. - (1) Unitățile au obligația de a asigura efectuarea de intervenții medicale asupra pacientului numai dacă dispun de dotările necesare și de personal acreditat.(2) Intervențiile medicale asupra pacientului pot fi efectuate în absența condițiilor prevăzute la alin. (1) numai în cazuri de urgență apărute în situații extreme".

- Comorbidități;
- Complicații;
- Comportamente alimentare, sociale, profesionale, culturale, religioase etc.;
- Atitudinea față de boală a pacientului;
- Etc.

9. DIAGRAMA – ALGORITMUL



10. INDICATORI DE EFICIENTĂ ȘI EFICACITATE

Indicatori de eficacitate – Concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare; concordanta intre diagnosticul preoperator cu cel postoperator; durata medie de spitalizare pentru o anumita categorie de pacienti.

- Indicatori de eficiență –

- Numărul de reclamații/plângeri ale pacienților;
- Rata infecțiilor asociate asistenței medicale pentru o anume categorie de pacienți;
- Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor secției pentru o anume categorie de pacienți;
- cost mediu / zi spitalizare pentru o anume categorie de pacienți;
- Durata medie de spitalizare pentru o anume categorie de pacienți;
- Rata de confirmare a diagnosticelor prezumtive ca urmare a examenului histopatologic, imagistic.
- Scop: menirea de a proteja pacientii si personalul medical prin asigurarea controlului calitatii serviciilor medicale. Protocolul a fost elaborat cu scopul de a asista personalul medical al sectiei clinice ORL din cadrul SCIMUT în adoptarea deciziei terapeutice în cazul pacienților care necesită tratamentul neoplasmului laringian std III si IV.
- Deși protocolul reprezintă o fundamentare a bunei practici medicale bazate pe cele mai recente dovezi științifice disponibile în domeniu, nu trebuie considerat că aceste recomandări includ toate intervențiile potrivite sau exclud pe toate cele nepotrivite pentru situația în cauză. Protocolul nu intenționează să înlocuiască raționamentul medical la fiecare caz în parte. Decizia medicală trebuie să ia în considerare particularitățile individuale și opțiunea pacientului, precum și resursele, caracterele specifice și limitările institutiilor de practica medicala. Fiecare medic care aplică recomandările în scopul stabilirii unui plan terapeutic trebuie să utilizeze propriul raționament medical independent, în funcție de fiecare caz în parte și în

funcție de experiență personală în corelație cu dotarea institutiei în care acesta își desfășoară activitatea.

- Specialiștii care au elaborat acest protocol au depus eforturi pentru ca informația conținută în acesta să fie corectă, redată cu acuratețe și susținută de dovezi. Dată fiind posibilitatea erorii umane și/sau progresele cunoștințelor medicale, ele nu pot și nu garantează că informația conținută în protocol este în totalitate corectă și completă. Recomandările din acest protocol sunt bazate pe consensul autorilor privitor la abordările terapeutice acceptate în momentul elaborării materialului.
- Persoanele care au elaborat acest protocol își declină responsabilitatea legală pentru orice inacuratețe, informație percepță eronat, pentru eficacitatea clinică sau succesul oricărei metode terapeutice detaliate în acest protocol, pentru modalitatea de utilizare sau aplicare sau pentru deciziile finale ale personalului medical rezultate din utilizarea sau aplicarea lor.
- În fiecare caz specific, utilizatorii protocolului trebuie să consulte literatura de specialitate prin intermediul surselor independente și să confirme că informația conținută este corectă.
- Prezentul protocol constituie suport informativ în acțiuni de auditare și/sau control.

11. ANEXE

1. Scala VAS pentru durere



2. Scorul ADL:

Pentru fiecare categorie vă rugăm să încercuiți itemul care descrie cel mai bine nivelul de dependență al persoanei

Activitate	Descriere	Scor
Igienă corporală	Autonomie	2
	Ajutat parțial	1
	Dependent	0
Îmbrăcare	Autonomie	2
	Autonomie pentru îmbrăcare, dar ajutor pentru încălțare	1
	Dependent	0
Mersul la toaletă	Autonomie	2
	Ajutat	1
	Ajutat la pat	0
Continență sfincteriană	Continent	2
	Incontinentă ocazional	1
	Incontinent	0

Alimentația	Mănâncă singur	2
	Ajutat pentru tăiat cu cuțitul	1
	Dependent	0

Clasificare:

- st. I 10 - autonomie;
- st. II 8-10 - cvasiindependent;
- st. III 3-8 - independență asistată;
- st. IV 0-3 - dependență totală, necesită asistent personal.